ASLIGA TO'G'RI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
"FARMATSEVTIKA MAHSULOTLARI
XAVFSIZLIGI MARKAZI"
DAVLAT MUASSASASI

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВЕЛСОН

Торговое название препарата: Велсон
Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения 5 мл
Состав:
В одной ампуле содержится:
активное вещество: Эссенциальные фосфолипиды из соевых бобов высушенной субстанции, содержащей 93% фосфотидилхолина (синоним - «эссенциальные фосфолипиды», EPL) 250 мг.
вспомогательные вещества: бензиловый спирт, натрия хлорид, раствор натрия гидроксида (20%), вода для инъекций.
Описание: желтый, однородный, прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа: гепатопротекторное средство.
Код АТХ: A05C

Фармакодинамика
Гепатопротекторное действие обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препарата.
«Эссенциальные фосфолипиды» - сложные вещества, представляющие собой диглицеридные эфиры фосфатидных и ненасыщенных жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой). Являются важным структурным элементом клеточных мембран и мембран органелл гепатоцитов. Фосфолипиды регулируют проницаемость мембран, активность мебраносвязанных ферментов, обеспечивая нормальные процессы окислительного фосфорилирования. Препарат нормализует биосинтез фосфолипидов и общий липидный обмен при повреждениях гепатоцитов различной этиологии. Восстанавливает мембраны гепатоцитов путем структурной регенерации и за счет конкурентного ингибирования окислительных процессов: встраиваясь в биомембраны, ненасыщенные жирные кислоты способны принимать на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов. Способствует регенерации печени, стабилизирует физико-химические свойства желчи.
Таким образом, оказывается нормализующее действие на метаболизм липидов и белков; на дезинтоксикационную функцию печени; на восстановление и сохранение клеточной структуры печени и фосфолипидозависимых ферментных систем; что, в конечном итоге, препятствует формированию соединительной ткани в печени.

Фармакокинетика
ЭФЛ в составе Велсон инъекции вводится В/В т. е биодоступность 100%. Поступает в клетки печени. Период полувыведения холинового компонента - 66 часов, ненасыщенных жирных кислот- 32 часа. Около 5% выводится с фекалиями.

Показания к применению
- жировая дегенерация печени различной этиологии, (в том числе при сахарном диабете);
- хронические гепатиты;
- цирроз печени;

- алкогольная и наркотическая интоксикация (в составе комбинированной терапии);
- отравления (в т. ч. лекарственные);
- нарушения функции гепатоцитов (как осложнение при других заболеваниях);
- повреждения гепатоцитов, обусловленные превышением предельно допустимых количеств вредных веществ в окружающей среде, повышенным радиационным фоном и воздействиями других неблагоприятных экологических факторов;
- псориаз (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для внутривенного введения назначают 250-500 мг (1-2 ампулы) (медленно), в тяжелых случаях 0,5-1 г (2-4 ампулы) в сутки на аутокрови в соотношении 1:1. Содержимое двух ампул можно вводить одновременно. Возможно разведение в физиологическом растворе 0,9% 200 мл, либо растворе глюкозы 5%, 10% 250 мл.

Применять только прозрачный раствор. Не смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами. Следует строго соблюдать технику в/в введения.

В/в введения препарата рекомендуется особенно в начале терапии в тяжелых случаях. Рекомендуется как можно быстрее дополнить парентеральное введение пероральным приемом препарата.

Категорически противопоказано вводить препарат Велсон внутримышечно из-за возможных местных реакций раздражения.

Побочные действия:

Препарат обычно хорошо переносится.

Со стороны пищеварительной системы: редко - чувство дискомфорта в области живота.

Очень редкая реакция повышенной чувствительности на бензиловый спирт, входящий в состав раствора для инъекции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Раствор для в/в инъекции нельзя применять для лечения детей в возрасте до 3 лет (из-за входящего в его состав бензилового спирта).

Лекарственные взаимодействия:

Лекарственного взаимодействия препарата с другими препаратами не описано.

Особые указания

Применение при беременности и период лактации

Не существует достаточно данных о влиянии препарата Велсон на беременность и ребенка в период грудного вскармливания. Во время беременности препарат следует использовать исключительно под наблюдение врача. При использовании препарата Велсон в период лактации, кормление ребенка грудью следует приостановить.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не наблюдалось.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Форма выпуска

Раствор для инъекции по 5 мл в ампулах. По 5 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения
Хранить при температуре от 2°С до 8°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту врача.

Производитель:
Genetek Lifesciences Private Limited, Индия.

Произведено для: Avison Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:
ООО "SHAYANA FARM"
Республика Узбекистан, г. Ташкент 700057, ул. Уста Ширин дом-117,
Тел.: 99(871) 2281692(93/94)
Факс: 99 (871) 2281695